

## QUESTIONARIO


## 3

**Fondazione IRCCS San Gerardo dei  
Tintori**

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la  
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di  
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età  
evolutiva (A.P.S Professioni Sanitarie della  
Riabilitazione)

**NON STRAPPARE**

l'involucro di plastica prima che venga  
dato il segnale di inizio della prova

**VERSIONE QUESTIONARIO**

## Questionario 3B

**1) La prensione radio-palmare è tipica:**

- A. A 3-4 mesi
- B. A 12 mesi
- C. A 8 mesi

**2) La causa principale delle paralisi del plesso brachiale nel bambino è legata a:**

- A. Predisposizione genetica
- B. Assunzioni di farmaci neurotossici
- C. Traumi da parto

**3) La riabilitazione neurovisiva si pone come obiettivo principale:**

- A. fornire ausili per la visione
- B. mantenimento e potenziamento dell'eventuale residuo visivo e recupero funzioni oculomotorie
- C. fornire attività che possono solo essere effettuate nella stanza di riabilitazione

**4) Cos'è il transfert?**

- A. La reazione emotiva dello psicoanalista a espressioni e comportamenti dell'analizzato
- B. La ripetizione di vissuti infantili, incongrui con la situazione attuale, spostati sullo psicoanalista
- C. Un meccanismo di difesa che consiste nel proiettare all'esterno i vissuti inaccettabili

**5) Il test DGM-P viene utilizzato nella valutazione:**

- A. Della scrittura
- B. Del linguaggio
- C. Delle funzioni esecutive

**6) La torre di Londra serve a valutare:**

- A. Le funzioni prassiche
- B. Le funzioni attentive
- C. Le funzioni esecutive

**7) In che epoca compare il pointing dichiarativo?**

- A. 5-6 mesi
- B. 9-13 mesi
- C. 12-14 mesi

**8) Il riflesso di prensione:**

- A. Si esprime attraverso un aumento di tono degli estensori
- B. È presente dal secondo mese di vita
- C. È un movimento involontario

**9) Il protocollo APCM-2 (Protocollo per la valutazione delle Abilità Prassiche e della Coordinazione Motoria):**

- A. è solo utilizzato per i bambini sopra i 5 anni
- B. è suddiviso per fasce d'età e al suo interno contiene sezioni di valutazione
- C. è un protocollo unico dai 2 agli 8 anni

**10) Tra gli schemi di movimento dell'APCM-2 (Protocollo per la valutazione delle Abilità Prassiche e della Coordinazione Motoria) vi sono:**

- A. Equilibrio e coordinazione, oculomozione, movimenti mani e dita, sequenzialità
- B. Coordinazione dinamica, abilità manuali, gesti simbolici, abilità prassico-costruttive
- C. Abilità grafo-motorie, movimenti oro-facciali intenzionali

**11) La sindrome di Down è una malattia cromosomica associata a:**

- A. trisomia del cromosoma 21
- B. duplicazione del cromosoma X
- C. monosomia del cromosoma 18

**12) Il comportamento polemico con umore collerico si ritrova tipicamente:**

- A. Nel disturbo oppositivo-provocatorio
- B. Nei disturbi dello spettro autistico
- C. Nel disturbo di sviluppo della coordinazione

**13) Il punteggio 2 nella scheda Son si riferisce a:**

- A. Abilità riscontrabile solo in presenza di facilitazioni
- B. Non è attualmente raggiunta
- C. Abilità emergente, ma non strutturata

**14) Le funzioni cognitive "fredde" si riferiscono a:**

- A. controllo emotivo e comportamentale del problema
- B. inibizione, memoria di lavoro, pianificazione
- C. posticipazione della gratificazione

**15) Cosa deve presentare un individuo per la diagnosi di disturbo dello spettro autistico secondo il DSM 5?**

- A. Deficit persistente della comunicazione/interazione sociale e pattern di comportamenti/attività/interessi ristretti e ripetitivi
- B. Assenza persistente di interessi ripetitivi
- C. Disturbo socio-pragmatico della comunicazione

**16) Secondo lo schema del livello di autonomia *prassie e manipolazioni* di G. Tardieu, il bambino sano a 15 mesi di età:**

- A. Fa una torre di 10 cubi
- B. Gira 2-3 pagine alla volta
- C. Afferra una piccola moneta

**17) "Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro" è la definizione di:**

- A. Dispositivo di Protezione Individuale
- B. Strumento di Sicurezza
- C. Strumento di Protezione

**18) A che età il bambino effettua il gioco di tipo funzionale?**

- A. 3 mesi
- B. 10 mesi
- C. 24 mesi

**19) L'esame psicomotorio di Pierre Vayer è diviso nelle seguenti fasce d'età:**

- A. 0-2 anni, 2-4 anni
- B. 0-2 anni, 2-4 anni, 5-7 anni
- C. 0-2 anni, 2-5 anni, 6-11 anni

**20) Quale fra le seguenti è una patologia a esordio infantile?**

- A. La malattia di Alzheimer
- B. La Distrofia Muscolare di Duchenne
- C. La Charcot-Marie-Tooth

